

¿Le cuesta ver de cerca?

Hágalo **VIZZ**ible

con **VIZZ**, un colirio con receta que se aplica una vez al día y que trata la visión borrosa de cerca por hasta 10 horas.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

VIZZ (solución oftálmica de aceclidina) 1.44 % es un colirio con receta indicado para tratar la presbicia (visión borrosa de cerca) relacionada con la edad en adultos.

Consulte la información importante de seguridad a lo largo del documento y la información de prescripción completa en <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

VIZZ se adapta a sus necesidades

Trata la visión borrosa de cerca con un **colirio que se aplica una vez al día**

Hace efecto **en 30 minutos**

Dura hasta **10 horas**

UN **95** %

de los pacientes notaron una mejoría en su visión borrosa de cerca después de usar VIZZ



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- No use VIZZ si es alérgico a alguno de sus componentes.
- Los efectos secundarios más frecuentes que se pueden experimentar al usar VIZZ incluyen: enrojecimiento ocular, irritación ocular, oscurecimiento de la visión o visión oscura temporal y dolor de cabeza.

¿Le frustra la visión borrosa de cerca?



Viva el momento con VIZZ.



Solo con fines ilustrativos



V I Z Z

(aceclidine ophthalmic solution) 1.44%

- Tenga cuidado de que la punta del vial no toque el ojo ni ninguna superficie para evitar posibles lesiones oculares o contaminación del producto. Deseche el vial abierto inmediatamente después de su uso.

Consulte la información importante de seguridad a lo largo del documento y la información de prescripción completa en <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

VIZZ se adapta a su estilo de vida



“VIZZ hace las cosas más sencillas y fáciles como solución para la visión borrosa de cerca, y te da más confianza para hacer lo que tienes que hacer”.

– **Sarah Jessica Parker**, usuaria real de VIZZ

Descubra lo que otros
opinan sobre VIZZ



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- Si usa lentes de contacto, retírelos antes de aplicar VIZZ. Pueden volver a colocarse 10 minutos después de la aplicación.
- Si se está utilizando más de un medicamento oftálmico tópico, los medicamentos deben administrarse con al menos 5 minutos de diferencia.
- Podría experimentar oscurecimiento de la visión o visión oscura temporal después de usar VIZZ. No conduzca ni opere maquinaria si su visión no es clara.

Qué esperar con VIZZ



¿Cómo debo usar VIZZ?

Aplique una gota de VIZZ en cada ojo. Espere 2 minutos, y luego aplique una segunda gota en cada ojo.

¿Puedo usar VIZZ todos los días?

VIZZ es un colirio que se aplica una vez al día y que puede utilizarse todos los días.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

VIZZ puede provocar efectos secundarios como enrojecimiento ocular, escozor al aplicar las gotas, oscurecimiento de la visión y dolor de cabeza. La mayoría de los efectos secundarios fueron temporales y se resolvieron por sí solos. Los efectos secundarios pueden reducirse con el uso continuado una vez al día.

- Busque atención médica inmediata si experimenta una aparición repentina de destellos de luz, manchas flotantes o pérdida de visión.

Consulte la información importante de seguridad a lo largo del documento y la información de prescripción completa en <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

Pregunte a su médico de la vista acerca de VIZZ

Un colirio con receta que se aplica una vez al día y que trata la visión borrosa de cerca por hasta 10 horas.



Obtenga más información
en [VIZZ.com](https://www.vizz.com)



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Consulte la información importante de seguridad a lo largo del documento y la información de prescripción completa en <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

Para informar REACCIONES ADVERSAS SOSPECHADAS, comuníquese con LENZ Therapeutics, Inc. al 1-888-711-LENZ o con la FDA al 1-800-FDA-1088, o visite www.fda.gov/medwatch.

© 2025 LENZ Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. US-ACE-1475-v1 (v1.0) 01/26