

Nhìn không rõ ở cự ly gần?

Có **VIZZ** trong tay,
nhìn gần sáng ngay

với **VIZZ**, thuốc nhỏ mắt kê đơn, dùng một lần mỗi ngày, giúp điều trị tình trạng nhìn mờ ở cự ly gần trong thời gian lên đến 10 tiếng



THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

VIZZ (dung dịch nhỏ mắt aceclidine) 1,44% là một loại thuốc nhỏ mắt kê đơn dùng để điều trị tình trạng nhìn mờ ở cự ly gần do tuổi tác (lão thị) ở người lớn.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng trong toàn bộ tài liệu và Thông tin kê đơn đầy đủ ở trang web: <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

VIZZ phù hợp với nhu cầu của quý vị

Điều trị tình trạng nhìn mờ ở cự ly
gần bằng **thuốc nhỏ mắt dùng
một lần/ngày**

Có tác dụng trong vòng **30 phút**

Hiệu quả kéo dài lên đến **10 tiếng**

95%

số bệnh nhân nhận thấy
có cải thiện thị lực ở cự ly
gần sau khi dùng VIZZ



THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG (tiếp)

- Không dùng VIZZ nếu quý vị bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Các tác dụng phụ phổ biến nhất có thể bị khi dùng VIZZ bao gồm: mắt đỏ, kích ứng mắt, nhìn mờ tạm thời hoặc thấy tối tạm thời và đau đầu.

Khó chịu vì nhìn mờ ở cự ly gần?



Giữ trọn từng phút giây cùng VIZZ.



Chỉ mang tính chất minh họa



V I Z Z

(aceclidine ophthalmic solution) 1.44%

- Hãy cẩn thận, không được chạm đầu lọ vào mắt hoặc bất kỳ bề mặt nào để tránh khả năng làm tổn thương mắt hoặc làm nhiễm bẩn thuốc. Vứt bỏ lọ đã mở ngay sau khi dùng.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng trong toàn bộ tài liệu và Thông tin kê đơn đầy đủ ở trang web: <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

VIZZ phù hợp với lối sống của quý vị



“ VIZZ, một giải pháp điều trị tình trạng nhìn mờ ở cự ly gần, giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn và dễ dàng hơn và quý vị sẽ tự tin hơn với các việc quý vị phải làm. ”

– **Sarah Jessica Parker**, người dùng VIZZ thực tế

Tìm hiểu xem người dùng khác
ưa thích VIZZ ở điều gì



THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG (tiếp)

- Nếu quý vị đeo kính áp tròng, hãy tháo kính đó ra trước khi nhỏ VIZZ. Sau khi nhỏ thuốc, có thể đeo lại kính áp tròng sau 10 phút.
- Nếu quý vị sử dụng nhiều hơn một loại thuốc dùng ở mắt, hãy sử dụng các thuốc này cách nhau ít nhất 5 phút
- Quý vị có thể có tình trạng nhìn mờ tạm thời hoặc thấy tối tạm thời sau khi dùng VIZZ. Không lái xe hay vận hành máy móc nếu tầm nhìn không rõ ràng.

Hỏi bác sĩ nhãn khoa của quý vị về VIZZ

Tôi dùng VIZZ như thế nào?

Nhỏ một giọt VIZZ vào mỗi mắt. Chờ 2 phút. Nhỏ một giọt thứ hai vào mỗi mắt.

Tôi có thể dùng VIZZ hàng ngày không?

VIZZ là loại thuốc nhỏ mắt dùng một lần mỗi ngày có thể dùng hàng ngày.

Có những tác dụng phụ nào?

VIZZ có thể dẫn đến các tác dụng phụ như mắt đỏ, cảm giác châm chích khi nhỏ thuốc, nhìn mờ và đau đầu. Phần lớn tác dụng phụ đều là tạm thời và tự hết. Tác dụng phụ có thể giảm khi tiếp tục dùng một lần mỗi ngày.

- Đi khám ngay lập tức nếu quý vị có khởi phát đột ngột hiện tượng chớp sáng, ruồi bay hoặc mất thị lực.

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng trong toàn bộ tài liệu và Thông tin kê đơn đầy đủ ở trang web: <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

Hỏi bác sĩ của quý vị về VIZZ

Thuốc nhỏ mắt kê đơn, dùng một lần mỗi ngày để điều trị tình trạng nhìn mờ ở cự ly gần trong thời gian tối đa 10 tiếng



Tìm hiểu thêm tại [VIZZ.com](https://www.vizz.com)



THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG (tiếp)

Vui lòng xem Thông tin an toàn quan trọng trong toàn bộ tài liệu và Thông tin kê đơn đầy đủ ở trang web: <https://www.vizz.com/prescribinginfo>.

Để báo cáo **PHẢN ỨNG BẤT LỢI NGHI NGỜ**, hãy liên hệ LENZ Therapeutics, Inc. theo số 1-888-711-LENZ hoặc FDA theo số 1-800-FDA-1088 hoặc truy cập trang web: www.fda.gov/medwatch.

© 2025 LENZ Therapeutics, Inc. Bảo lưu mọi quyền.
Tất cả các thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. US-ACE-1540-v1 (v1.0)