

看近处时特别费力？

VIZZ 一滴，又见清晰

处方滴眼液 VIZZ，每日一次，可治疗近距离视力模糊，效果长达 10 小时



重要安全信息

VIZZ (醋克利定眼用溶液) 1.44% 是一款处方滴眼液，用于治疗成人年龄相关性近距离视力模糊 (老视)。

请查看本手册包含的所有重要安全信息，并前往 <https://www.vizz.com/prescribinginfo> 阅读完整处方信息。

VIZZ, 轻松满足用眼需求

治疗近距离视力模糊的滴眼液,
每日只需使用一次

30 分钟内起效

效果持续长达 10 小时

95%


的患者在使用 VIZZ 后,
近距离视力得到改善



重要安全信息 (续)

- 若对 VIZZ 的任何成分过敏, 请勿使用本品。
- 使用 VIZZ 可能出现的最常见不良反应包括: 眼睛发红、眼部刺激、暂时性视物昏暗或视野发暗、头痛。

受够了看近处总是一片模糊？



VIZZ, 让您尽享此刻清晰。



图片仅作说明之用



V I Z Z

(aceclidine ophthalmic solution) 1.44%

- 为避免潜在的眼部受伤或产品污染, 请注意不要让药瓶尖端接触到您的眼睛或任何物体表面。使用后, 请将开启的药瓶立即丢弃。

请查看本手册包含的所有重要安全信息, 并前往 <https://www.vizz.com/prescribinginfo> 阅读完整处方信息。

VIZZ, 掌控生活焦点



“VIZZ 帮我应对近距离视力模糊问题, 一切事务变得更加简单轻松, 让我做起事来更有自信了。”

- 莎拉·杰西卡·帕克, VIZZ 真实用户

了解其他人喜爱 VIZZ 的原因



重要安全信息 (续)

- 如果您佩戴隐形眼镜, 请在滴用 VIZZ 前将其取下。给药 10 分钟后, 可重新佩戴隐形眼镜。
- 如需同时使用多种局部眼用药物, 不同药物的给药间隔应至少为 5 分钟。
- 使用 VIZZ 后, 可能会出现暂时性视物昏暗或视野发暗。若视力不清晰, 请勿驾驶或操作机械。

VIZZ 会带来怎样的体验？

● 如何使用 VIZZ？

每只眼滴入 1 滴 VIZZ。间隔 2 分钟后，每只眼再滴入 1 滴。

VIZZ 可以每天使用吗？

VIZZ 为每日使用一次的滴眼液，可以每天使用。

有哪些不良反应？

VIZZ 可能会导致一些不良反应，如眼睛发红、滴药时有刺痛感、视物昏暗和头痛。大多数不良反应都是暂时性的，可自行缓解。坚持每日一次持续使用，不良反应可能会减少。

- 如果出现突发的闪光感、飞蚊症或视力丧失，请立即就医。

请查看本手册包含的所有重要安全信息，并前往 <https://www.vizz.com/prescribinginfo> 阅读完整处方信息。

请向您的眼科医生 咨询 VIZZ

一款处方滴眼液, 每日使用一次, 可治
疗近距离视力模糊, 效果长达 10 小时



访问 [VIZZ.com](https://www.vizz.com) 了解更多



重要安全信息 (续)

请查看本手册包含的所有重要安全信息, 并前往 <https://www.vizz.com/prescribinginfo> 阅读完整处方信息。

如需报告疑似不良反应, 请拨打 1-888-711-LENZ 联系 LENZ Therapeutics, Inc., 也可以通过 1-800-FDA-1088 或 www.fda.gov/medwatch 联系 FDA。

© 2025 LENZ Therapeutics, Inc. 保留所有权利。
所有商标均为其各自所有者的财产。

US-ACE-1535-v1 (v1.0) 01/26